



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 13-02-2026

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-02-13 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-02-14	2026-02-15	2026-02-16	2026-02-17	2026-02-18
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	29.0	30.0	30.0	31.0	32.0
न्यूनतम तापमान(से.)	14.0	15.0	16.0	17.0	17.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	42	37	37	34	38
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	24	24	24	21	23
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	2	1	1	1	1
पवन दिशा (डिग्री)	45	15	27	153	84
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	1	0	0	1
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

पूर्वानुमान सारांश:

आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 29.0 से 32.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 14.0 से 17.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना। हवा की गति 01-02 किमी/घंटा रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई चेतावनी नहीं

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई नहीं

सामान्य सलाहकार:

अगर खेत में खरपतवार दिखाई दे तो उसे हटा दें क्यों की यह समय खरपतवारों के बीज बनने का समय है। अगर खरपतवारों को हटा दिया जाए तो अगले वर्ष खरपतवारों के नियंत्रण में आसानी होगी।

लघु संदेश सलाहकार:

मौसम पूर्वानुमान और कृषि मौसम परामर्श प्राप्त करने के लिए "मेघदूत ऐप" डाउनलोड करें। मेघदूत ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
सरसों	सरसों की फसल परिपक्वता के करीब या अभी भी परिपक्व अवस्था में हो सकती है, इसलिए किसानों को नुकसान से बचा जा सके।
गेहूँ	किसान भाई गेहूं की फसल में दाने की दूधिया अवस्था पर सिंचाई अवश्य करें। फसल में दीमक के नियंत्रण हेतु क्लोरोपायरीफास 20 ई.सी 4 लीटर प्रति हैक्टेयर सिंचाई के साथ दें।
चना	किसानों को सलाह दी जाती है कि वर्षा आधारित क्षेत्र में बोई गई चना की फसल अगर पक गई है तो उसकी कटाई करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
जीरा	किसान भाई जीरे की फसल में बीज बनने की अवस्था पर हल्की सिंचाई करें। जीरे की फसल में फसल में एफिड कीट का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण हेतु डाइमिथोएट 30 ईसी. एक मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से या ऐसीफेट 75 एस.पी. 750 ग्राम प्रति हैक्टेयर की दर से छिड़काव करें।
	ईसबगोल की फसल में मोयला की रोकथाम के लिए क्लोथियानिडिन 50 डब्ल्यू.डी.जी. कीटनाशी 1 ग्राम प्रति 5 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
लहसुन	लहसुन में ग्रिप्स कीट (पर्ण जीवी कीट) के प्रकोप की सम्भावना है। यह कीट पत्तियों से रस चूसता है जिससे पत्तिया कमजोर पड़ जाती है तथा हानि वाले स्थान पर सफेद चकतें पड़ जाते हैं। इस कीट के नियंत्रण हेतु मिथाइल डिमेटोन 25 ई.सी. एक मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
भिंडी	ग्रीष्मकालीन भिंडी की फसल के लिए परभनी क्रान्ति, वर्षा उपहार, आजाद क्रान्ति, अर्का अनामिका व अर्का अभय की बुवाई करें। बुवाई हेतु 20-22 किलो ग्राम बीज प्रति हैक्टेयर प्रयोग में लें। 20 किलो नत्रजन, 50 किलो फास्फोरस व 60 किलो पोटास प्रति हैक्टेयर की दर से अन्तिम जुताई के समय खेत में डालें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
बकरा	इस समय भेड़ व बकरी में माता एंव कन्टेजियस एक्थाईमा (ORF) की सम्भावना भी अधिक रहती है। यदि भेड़ व बकरी में माता रोग से बचाने के टीके नहीं लगवाएं हैं तो टीकाकरण करवा लें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई नहीं

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

کوئی نہیں

Farmers are advised to download Unified ♦Mausam♦ and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>