



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
 भारत मौसम विज्ञान विभाग  
 आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान  
 जोधपुर, राजस्थान



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 13-04-2026

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-04-13 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-04-14	2026-04-15	2026-04-16	2026-04-17	2026-04-18
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	38.0	38.0	39.0	39.0	39.0
न्यूनतम तापमान(से.)	21.0	21.0	22.0	22.0	22.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	19	28	28	27	23
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	7	12	11	11	9
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	1	3	3	3	4
पवन दिशा (डिग्री)	225	214	226	229	226
क्लाउड कवर (ओक्टा)	3	2	8	8	2
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

### पूर्वानुमान सारांश:

आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना। हवा की गति 1-4 किमी/घंटा रहने की संभावना है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

आने वाले दिनों में कोई चेतावनी नहीं।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई नहीं

### सामान्य सलाहकार:

रबी फसलो की कटाई का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अनाज बीज का भंडारण करना जरूरी है। अनाज बीज को दो दिन धूप में सुखाएं शाम को छाया में रख कर ठंडा करके भंडारित करें। भंडारण पात्र में नीम की पत्तियां रखें जिससे कीड़े की सम्भावना न हो, सल्फास पाउच का उपयोग भी कर सकते हैं।

### लघु संदेश सलाहकार:

किसान भाई गेहूं की फसल की कटाई व थ्रेसिंग का कार्य पूरा करें तथा सुरक्षित स्थान पर रखें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
बैंगन	बैंगन की फसल में तना व फल छेदक का प्राकोप दिखाई देने पर नियंत्रण हेतु साइपरमेथ्रिन 5 मिली लीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
भिण्डी	भिण्डी की फसल में माईट कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। अधिक कीट पाये जाने पर इथेयॉन 1.5-2 मि.ली. प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।

### अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	तापमान में वृद्धि को देखते हुए कुष्माण्ड कुल की गीर्ष्मकालीन सब्जियों जैसे लौकी, तुरई, करेला, खीरा, ककड़ी तथा गीर्ष्मकालीन भिण्डी में सिंचाई करें।
सामान्य सलाह	रबी फसल की कटाई के बाद खाली खेतों की गहरी जुताई कर जमीन को खुला छोड़ दे ताकि सूर्य की तेज धूप से गर्म होने के कारण इसमें छिपे कीड़ों के अण्डे तथा घास के बीज नष्ट हो जायेंगे।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई नहीं

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई नहीं

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightning.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)

Damini MobileApp link : [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)