



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं
(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)



केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003

दिनांक: 15 मई 2018

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,

जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

| मौसमी तत्व / दिनांक | 16/05/18 | 17/05/18 | 18/05/18 | 19/05/18 | 20/05/18 |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| वर्षा (मि.मी.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अधिकतम तापमान (°सेल्सियस) | 42 | 43 | 43 | 42 | 43 |
| न्यूनतम तापमान (°सेल्सियस) | 29 | 28 | 29 | 28 | 28 |
| बादलों की स्थिति (ओक्टा) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह | 43 | 43 | 45 | 42 | 42 |
| सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 |
| हवा की गति (कि.मी/घंटा) | 12 | 12 | 8 | 11 | 12 |
| हवा की दिशा | पश्चिम- दक्षिण- पश्चिम | पश्चिम | पश्चिम | पश्चिम | पश्चिम |

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

| फसल | अवस्था | सलाह |
|------------|--------|---|
| टमाटर | फल | टमाटर की फसल में झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए 2 ग्राम मैन्कोजेब का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। |
| मृदा उपचार | | तापमान में बढ़ोतरी की सम्भावना को देखते हुए खाली खेतों की गहरी जुताई कर खुला छोड़ें ताकि तेज धूप से मृदा में छिपे कीड़ों के अण्डे नष्ट हो जाएं। |
| बेर | छंटाई | बेर के पौधों की कटाई-छंटाई का उचित समय है। कटाई छटाई करने से पौधे के कक्ष से जो नये प्ररोह निकलते हैं उन्ही पर फूल एवं फल लगते हैं जिससे फल उत्पादन में वृद्धि होती है। |
| बैंगन | फल | बैंगन की फसल में फल छेदक कीट के नियंत्रण हेतु प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी में दबाएं तथा क्यूनालफॉस 1 मि.ली. का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। |
| पशु | | गर्मी के कारण पशु के दूध उत्पादन में कमी आती है अतः पशुओं को उचित मात्रा में लवण खिलाएं तथा पीने का पानी उपलब्ध कराएं। |

(नौडल ऑफीसर)