



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
**भारत मौसम विज्ञान विभाग**  
**आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान**  
**जोधपुर, राजस्थान**



## **मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं**

दिनांक : 05-12-2025

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-12-05 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-12-06	2025-12-07	2025-12-08	2025-12-09	2025-12-10
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	27.0	26.0	29.0	29.0	28.0
न्यूनतम तापमान(से.)	14.0	13.0	13.0	13.0	11.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	19	18	19	20	20
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	51	51	50
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	12	9	9	13	13
पवन दिशा (डिग्री)	286	274	172	161	161
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	0	0	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

### पूर्वानुमान सारांश:

आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 26.0 से 28.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 11.0 से 14.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना। हवा की गति 09-13 किमी/घंटा रहने की संभावना है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई चेतावनी नहीं

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई नहीं

### सामान्य सलाहकार:

**किसान भाई खरपतवार नियंत्रण व फसल की अच्छी वृद्धि के लिए मैथी, इसबगोल, सरसों व चने की फसल में निराई गुडाई करें।**

### लघु संदेश सलाहकार:

**किसान भाई जीरा की फसल में अच्छे अंकुरण के लिए 7-8 दिन के अन्तराल पर सिंचाई करते रहें।**

### फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	किसान भाई गेहूँ की बुवाई दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक पूर्ण करें। राज-3077, राज-3777, राज-4037 व राज-1482 उन्नत किस्मों की बुवाई करें। बीज की मात्रा 100 किलो ग्राम प्रति हैक्टेयर रखें। नत्रजन, फास्फोरस व पोटाश उर्वरकों की मात्रा 60, 40 व 20 किलो ग्राम प्रति हैक्टेयर होनी चाहिए।
चना	चने की फसल में रूट रोट रोग के लक्षण दिखाई देने पर पौधे को जड़ सहित उखाड़ने पर जड़ में सफेद फूल्दी की वृद्धि दिखाई देती है। पौधा मुरझा कर सुख जाता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए कार्बन्डाजिम 50 डब्ल्यू पी को 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
प्याज	प्याज की तैयार पौधे की रोपाई करें। रोपाई से पूर्व 50 किलो नत्रजन, 50 किलो फास्फोरस एंव 100 किलो पोटाश प्रति हैक्टेयर की दर से खेत तैयार करते समय अन्तिम जुताई के समय दें।
जीरा	जीरे की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए ऑक्साडाईरजिल या ऑक्सीफ्लोरफेन 50 ग्राम प्रति हैक्टेयर की दर से बुवाई के 20 दिन बाद छिड़काव करें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं में न्यूमोनिया के लक्षण जैसे बुखार, दस्त, नाक व आंख से पानी आना दिखाई देने पर उसे तुरन्त अन्य स्वस्थ पशुओं से पृथक कर दें और निकटतम पशुचिकित्सक से परामर्श लें।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

**कोई नहीं**

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

**कोई नहीं**

**Farmers are advised to download Unified ♦Mausam♦ and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightning.**

**Mausam MobileApp link:** <https://play.google.com/store/apps/details/>

**Meghdoot MobileApp link:** <https://play.google.com/store/apps/details/>

**Damini MobileApp link :** <https://play.google.com/store/apps/details/>