



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 16-12-2025

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-12-16 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

| मौसम कारक | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| वर्षा (मिमी) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| अधिकतम तापमान(से.) | 29.0 | 30.0 | 30.0 | 29.0 | 29.0 |
| न्यूनतम तापमान(से.) | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 |
| अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%) | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 |
| न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%) | 45 | 45 | 51 | 51 | 50 |
| हवा की गति (किमी प्रति घंटा) | 12 | 9 | 9 | 13 | 13 |
| पवन दिशा (डिग्री) | 286 | 274 | 172 | 161 | 161 |
| क्लाउड कवर (ओक्टा) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| चेतावनी | कोई चेतावनी नहीं |

पूर्वानुमान सारांश:

आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 29.0 से 30.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 12.0 से 13.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना। हवा की गति 09-13 किमी/घंटा रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

अगले पांच दिनों में कोई चेतावनी नहीं दी जाएगी।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई नहीं

सामान्य सलाहकार:

किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खरपतवार नियंत्रण व फसल की अच्छी वृद्धि के लिए मैथी, ईसबगोल, सरसों व चने की फसल में निराई गुडाई करें।

लघु संदेश सलाहकार:

किसान भाई जीरा की फसल में अच्छे अंकुरण के लिए 7-8 दिन के अन्तराल पर सिंचाई करते रहें।

फसल विशिष्ट सलाह:

| फसल | फसल विशिष्ट सलाह |
|-------|--|
| सरसों | किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि तापमान में कमी तथा आद्रता अधिक होने पर सरसों की फसल में सफेद रोली (डाउनी मिल्ड्यू) रोग की लगातार निगरानी करें। सफेद रोली रोग से फसल बुवाई के 50 से 60 दिन बाद या दिसंबर माह में पतियों की निचली सतह पर सफेद रंग के ऊभरे हुए फफोले दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए प्रथम छिड़काव मेटालेक्सिल 0.2 प्रतिशत (2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर) का घोल बनाकर छिड़काव करें। |
| गेहूँ | किसानों को सलाह दी जाती है कि समय से बोई गई गेहूँ की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 21 दिन बाद करें तथा नाइट्रो जन की 30 प्रतिशत मात्रा (55-65 कि.ग्रा. यूरिया/हेक्टेयर) भी सिंचाई के समय डालें। |

बागवानी विशिष्ट सलाह:

| बागवानी | बागवानी विशिष्ट सलाह |
|---------|---|
| जीरा | किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जीरे की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए ऑक्साडाईरजिल या ऑक्सीफ्लोरफेन 50 ग्राम प्रति हैक्टेयर की दर से बुवाई के 20 दिन बाद छिड़काव करें। |

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

| पशुपालन | पशुपालन विशिष्ट सलाह |
|---------|---|
| भेंस | पशुओं में न्यूमोनिया के लक्खण जैसे बुखार, दस्त, नाक व आंख से पानी आना दिखाई देने पर उसे तुरन्त अन्य स्वस्थ पशुओं से पृथक कर दें और निकटतम पशुचिकित्सक से परामर्श लें। |

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई नहीं

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई नहीं

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>