

Agromet Advisory Service bulletin for the District Jodhpur

(18th August to 22nd August 2010)

(Issued jointly by IAAS, Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur
& India Meteorological Department)

Medium range weather forecast for next five days (18th Aug. to 22nd Aug. 2010)

| Weather | 18-Aug | 19-Aug | 20-Aug | 21-Aug | 22-Aug |
|---------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Rainfall (mm) | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Max Temperature (deg C) | 33 | 34 | 33 | 32 | 32 |
| Min Temperature (deg C) | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 |
| Total Cloud Cover (oktas) | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Max Relative Humidity (%) | 96 | 91 | 96 | 97 | 93 |
| Min Relative Humidity (%) | 65 | 62 | 64 | 68 | 70 |
| Wind speed (kmph) | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| Wind direction (deg) | SW | SW | SSW | SW | SW |
| 7 days cum. Rainfall (mm) | 16.0 mm | | | | |

कृषि सुझाव:-

- बाजरा की 15 से 20 दिन वाली फसल में निराई गुडाई करें तथा वर्षा के साथ नत्रजन का छिड़काव करें। फसल के कतारों के बीच वर्षा के पानी संचय के लिये नालियां बना दें जिससे वर्षा का पानी फसल के पकने वाली अवस्था तक संरक्षित रहते।
- कपास की फसल में 60 दिन पूरे होने पर एक थैला यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से बगल से कतारों में सिंचाई के साथ दें।
- जहाँ कहीं हरा तैला, थ्रिप व सफेद मक्खी का प्रकोप हो तो मेटासिस्टोक्स 30 से 35 मिलीलिटर प्रति 15 लिटर टंकी के हिसाब से छिड़काव करें।
- पूर्व में लगाए गये फल वाले पौधों में यूरिया खाद की पहली मात्रा का प्रयोग करें। फल व सब्जियों में सम्भावित रोगों की रोकथाम के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें।
- ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें व अलग बाड़े में रहने की व्यवस्था करें। पशु बाड़े में कीटनाशक का छिड़काव करें ताकि पशु रोग न फैलें।
- सभी पशुओं को कृमिनाशक दवा अवश्य पिलाएं तथा चिचड़ों का इलाज भी कराये। गलघोटू व काला ज्वर के लिए पशुओं का टीकाकरण अवश्य कराये। बरसात के मौसम में सभी पशुओं के आहार व स्वास्थ्य प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। हरा चारा खिलाने की मात्रा कम रखे जिससे पशुओं में आफरा नहीं होवे।