

**Agromet Advisory Service bulletin for the District Jodhpur**  
(19<sup>th</sup> May to 23<sup>rd</sup> May 2010)

(Issued jointly by IAAS, Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur  
& India Meteorological Department)

Medium range weather forecast for next five days (19<sup>th</sup> May to 23<sup>rd</sup> May 2010)

Weather	19-May	20-May	21-May	22-May	23-May
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max Temperature (deg C)	43	43	44	44	44
Min Temperature (deg C)	31	30	31	31	31
Total Cloud Cover (oktas)	1	1	0	1	0
Max Relative Humidity (%)	38	40	42	38	39
Min Relative Humidity (%)	11	9	8	10	11
Wind speed (kmph)	9	13	12	11	9
Wind direction (deg)	SW	SW	SW	WSW	WSW
7 days cum. Rainfall (mm)	0.0 mm				

**कृषि सुझाव:-** दिन का तापमान 43 से 44 डिग्री सेंटीग्रेट के बीच में रहने की संभावना

1. काजरी की कृषि विज्ञान सुझाव सेवा समिति, सलाह देती है कि जीरे की फसल पर लगने वाले उखटा रोग के उपचार के लिये किसान भाइयों को अभी से तैयारी चाहिये। जिन किसान भाइयो के पास सिंचाई की सुविधा हो व जिस खेत में आने वाली रबी में जीरा लगाना चाहते हो वह जीरे की फसल पर लगने वाले उखटा रोग के उपचार के लिये अभी से तैयारी कर लेवें। जिस खेत में आने वाली रबी में जीरा लगाना है, उसमें सरसों की फलकटी 2.5 टन व 0.5 टन सरसों की खली प्रति हेक्टर का भुरकाव करके तवीये निकाल कर एक पानी तेज गर्मी के समय दे देना चाहियें ताकि फलकटी व खल के सड़ने से जो गैस निकले उससे उखटा रोग की फंफूद अभी ही खत्म हो जाये। यह कार्य तेज गर्मी के समय ही करना जरूरी है। इससे दलहनों में लगने वाली जड़ गलन का प्रकोप भी कम हो जायेगा।
2. तापमान बेर के पौधो की कटाई— छंटाई के लिये उपयुक्त है। कटाई— छंटाई करने से नई स्वस्थ टहनियां अधिक निकलती हैं। जिन पर बड़े आकार के फल लगते है। काटे गये स्थान पर फफूंदनाशी बोरडेक्स मिश्रण का लेप कर दें।
3. फलदार वृक्षों व सब्जियों को सिंचाई नियमित रूप से करें।
4. पशुओं को चरने के लिये सुबह—सुबह ही छोड़े।