

**Agromet Advisory Service bulletin for the District Jodhpur**  
(26<sup>th</sup> May to 30<sup>th</sup> May 2010)

(Issued jointly by IAAS, Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur  
& India Meteorological Department)

Medium range weather forecast for next five days (26<sup>th</sup> May to 30<sup>th</sup> May 2010)

Weather	26-May	27-May	28-May	29-May	30-May
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max Temperature (deg C)	44	44	45	44	44
Min Temperature (deg C)	32	31	30	30	30
Total Cloud Cover (oktas)	0	0	1	0	0
Max Relative Humidity (%)	45	41	42	38	40
Min Relative Humidity (%)	9	11	12	10	10
Wind speed (kmph)	13	13	11	10	13
Wind direction (deg)	SW	SW	SW	SSW	SSE
7 days cum. Rainfall (mm)	0.0 mm				

**कृषि सुझाव:-** दिन का तापमान 44 डिग्री सेंटीग्रेट के आसपास बने रहने की संभावना

1. काजरी की कृषि विज्ञान सुझाव सेवा समिति, सलाह देती है कि जीरे की फसल पर लगने वाले उखटा रोग के उपचार के लिये किसान भाइयों को अभी से तैयारी चाहिये। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा हो व जिस खेत में आने वाली रबी में जीरा लगाना चाहते हो वह जीरे की फसल पर लगने वाले उखटा रोग के उपचार के लिये अभी से तैयारी कर लें। जिस खेत में आने वाली रबी में जीरा लगाना है, उसमें सरसों की फलकटी 2.5 टन व 0.5 टन सरसों की खली प्रति हेक्टर का भुरकाव करके तवीये निकाल कर एक पानी तेज गर्मी के समय दे देना चाहिये ताकि फलकटी व खल के सड़ने से जो गैस निकले उससे उखटा रोग की फंफूद अभी ही खत्म हो जाये। यह कार्य तेज गर्मी के समय ही करना जरूरी है। इससे दलहनों में लगने वाली जड़ गलन का प्रकोप भी कम हो जायेगा।
2. तापमान बेर के पौधों की कटाई— छंटाई के लिये उपयुक्त है। कटाई— छंटाई करने से नई स्वस्थ टहनियां अधिक निकलती हैं। जिन पर बड़े आकार के फल लगते हैं। काटे गये स्थान पर फफूंदनाशी बोरडेक्स मिश्रण का लेप कर दें।
3. फलदार वृक्षों व सब्जियों को सिंचाई नियमित रूप से करें।
4. पशुओं को चरने के लिये सुबह—सुबह ही छोड़ें।