

## Agromet Advisory Service bulletin for the District Jodhpur

(5<sup>th</sup> May to 9<sup>th</sup> May 2010)

(Issued jointly by IAAS, Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur  
& India Meteorological Department)

Medium range weather forecast for next five days (5<sup>th</sup> May to 9<sup>th</sup> May 2010)

Weather	5-May	6-May	7-May	8-May	9-May
Rainfall (mm)	1	0	0	0	0
Max Temperature (deg C)	44	43	43	44	43
Min Temperature (deg C)	31	30	29	29	29
Total Cloud Cover (oktas)	4	2	0	0	0
Max Relative Humidity (%)	49	49	44	38	41
Min Relative Humidity (%)	13	12	15	15	12
Wind speed (kmph)	11	10	9	7	11
Wind direction (deg)	WSW	WSW	SW	W	SSW
7 days cum. Rainfall (mm)	1.0 mm				

**कृषि सुझाव:-** दिन का तापमान 43 से 44 डिग्री सेंटीग्रेट के बीच में रहने की संभावना

1. जिन किसान भाइयों के पास सिचॉई की सुविधा हो आगामी रबी की फसल में जीरा लगाना चाहते हो वह जीरे की फसल पर लगने वाले उखटा रोग के उपचार के लिये अभी से तैयारी कर लेवें। जिस खेत में आने वाली रबी में जीरा लगाना है, उसमें सरसों की फलकटी 2.5 टन व 0.5 टन सरसों की खली प्रति हेक्टर का भुरकाव करके तवीये निकाल कर एक पानी तेज गर्मी के समय दे देना चाहियें ताकि फलकटी व खल के सड़ने से जो गैस निकले उससे उखटा रोग की फंफूद अभी ही खत्म हो जाये। यह कार्य तेज गर्मी के समय ही करना जरूरी है। इससे दलहनों में लगने वाली जड़ गलन का प्रकोप भी कम हो जायेगा।
2. हरे चारे वाली फसल व सब्जियों वाली फसल फसल के चारों ओर बाड़ बना दें जिससे लू का असर कम होवे तथा हर तीन चार दिनों में पानी देवें।
3. खेतों की मेड़ ठिक करें जिससे हवा द्वारा मिट्टी का कटाव कम होवे।
4. बेर के पेंडों की कटाई छटाई करने के लिये मौसम उपयुक्त है।
5. पशुओं को गर्मी व गर्म हवाओं से बचावें तथा हरा चारा भी देवें। पशुओं को सुबह जल्दी चरने के लिये भेजे व दोपहर पहले छायादार जगह पर रखे तथा दिन में तीन चार बार पानी पिलावे तथा सुबह शाम नहलाते रहें।