



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
Jodhpur, Rajasthan



Agromet Advisory Bulletin

Date : 16-08-2019

Weather Forecast of JODHPUR(Rajasthan) Issued On : 2019-08-16(Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Date (y-m-d)	Rainfall (mm)	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RH I (%)	RH II (%)	Wind Speed (kmph)	Wind Direction (Degree)	cloud cover (Octa)
2019-08-17	55.0	34.0	28.0	89	29	26.0	200	8
2019-08-18	1.0	35.0	27.0	88	28	24.0	230	5
2019-08-19	2.0	36.0	28.0	87	28	17.0	210	6
2019-08-20	0.0	34.0	27.0	87	27	15.0	270	4
2019-08-21	0.0	34.0	28.0	86	27	18.0	290	2

Weather Summary/Alert:

There is a possibility of rain up to 21 August.

अगले पांच दिनों तक वर्षा की सम्भावना है।

General Advisory:

Intercultural operations in pearl millet and legumes for weed controlling after clear weather.

मौसम के साफ होने के बाद बाजरा व अन्य दलहनी फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए अन्तः शस्य क्रियायें करें।

SMS Advisory:

In view of prevailing and rain forecast conditions, arrange the proper drainage in pulses crop.

वर्तमान में हो रही वर्षा और आगामी दिनों में वर्षा की सम्भावना को देखते हुए दलहनी फसलों में उचित जल निकास की व्यवस्था करें।

Crop Specific Advisory:

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory
GROUNDNUT(HNG-10 HNG-123 RG-425 PARKAS GG-7 GIRNAR-2 AND TG-37)	To control yellowing of foliage in groundnut crop, spray 0.1 % Sulphuric acid or 0.5 % Ferrous Sulphate (Harakasis). मूंगफली की फसल में पीलिया रोग के लक्षण दिखाई देते ही गन्धक का अम्ल 0.1 प्रतिशत या हरा कसीस के 0.5 प्रतिशत घोल का छिड़काव करें।
SOURGHUM (GENERAL)	For the control of shoot borer and short fly attack in sorghum crop, top dressing of Quinalphos 5% @ 8-10 kg/ha, the granules of chemicals should retain in top leaf (25 DAS).

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory
	ज्वार की फसल में तना छेदक व तना मक्खी का प्रकोप होने पर क्यूनालफॉस 5 प्रतिशत कण 8-10 किलो प्रति हेक्टेयर की दर बुवाई के 25 दिन बाद पौधों के पोटों में डालें।

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture (Varieties)	Horticulture Specific Advisory
COMMON(COMMON)	The creepers of cucurbit crops should be lifted above the ground on a trellis made of bamboo. कुष्माण्ड कुल की सब्जियों को बांस या जाली पर चढ़ाने की व्यवस्था करें जिससे वर्षा के कारण सब्जियों की लताओं को गलने से बचाया जा सके।
CHILLI(HARIPUR-RAIPUR PUNJAB LAL PUSA SHADABHAR NP-46A PUSA JWALA)	To control sucking pests attack in chilli crop spray Quinalphos 25 EC @ 1 liter per hectare. मिर्च की फसल में रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण हेतु क्यूनालफॉस 25 ई.सी. एक लीटर का प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें।

Livestock Specific Advisory:

Livestock(Varieties)	Livestock Specific Advisory
LIVESTOCK(LIVESTOCK)	Protect domestic animals from coming in direct contact with rains. Do not allow water to stagnate in their sheds. Try to keep their litter dry. पालतू जानवरों को सीधी वर्षा से बचाने के समुचित उपाय करें एवं उनके रहने के स्थान पर पानी इकट्ठा न होने दें तथा बिछावन को सूखा रखें।